

Strategia Dipendenze – Allegato I (capitolo 6.2): statistiche 2013

Dati in percentuale e in numeri assoluti arrotondati relativi alle persone interessate in Svizzera nel 2013. Queste stime vanno prese con cautela poiché le percentuali provengono da campioni e quindi sono soggette a errore standard, che può determinare importanti deviazioni specialmente per piccole percentuali.

Forma di dipendenza	Diffusione e consumo problematico dai 15 anni di età ¹			Fasce d'età selezionate	Mortalità (annuale)	Costi	Altri indicatori Trattamenti ² ; denunce; esclusioni	Andamento negli ultimi 5 anni ³ (somma degli indicatori)
Alcol	Consumo cronico a rischio (ultimi 12 mesi) Rischio elevato: 1 % (70 000) Rischio moderato: 2,9 % (200 000)	Binge drinking 2 volte/sett.: 5,9 % (400 000) 1 volta/mese: 11,1 % (750 000)	Combinazione di consumo cronico a rischio e binge drinking Almeno 1 volta nell'ultimo mese Totale: 22 % (1,5 mio.) Dipendenza dall'alcol Totale: circa 250 000	Binge drinking (almeno 1 volta/mese) 20-24 anni: 41,8 % (200 000) Consumo cronico a rischio (ultimi 12 mesi) 55-74 anni: 5,7 % (100 000)	15-74 anni: 1600 decessi (2011)	Costi sociali 2010 Diretti: 0,8 mia. fr. Indiretti: 3,4 mia. fr.	Entrate in trattamento 2012: Ambulatoriali: 5711 Stazionarie: 1289	Tendenzialmente stabile
Tabacco	Fumatori giornalieri 17,6 % (1,2 mio.)	Fumatori occasionali 7,4 % (500 000)	Esposizione al fumo passivo (1+ ore/settimana) 6 % (400 000)	Fumatori giornalieri 15-19 anni: 10,8 % (47 700) 20-34 anni: 22,3 % (360 000) Fumatori occasionali 15-19 anni: 11,9 % (52 000) Esposizione al fumo passivo (3-6 ore/settimana) 15-24 anni: 25 % (240 000)	9200 decessi (2007)	Costi medici diretti 1,2 mia. fr. Costi indiretti 3,8 mia. fr. (perdite di lavoro, costi per invalidità, ecc.)	Circa un quarto dei fumatori giornalieri negli ultimi 12 mesi cerca di smettere di fumare	Tendenzialmente stabile a livello elevato rispetto agli Stati membri dell'UE
Canapa	Almeno 1 volta nell'ultimo anno: 5,7 % (400 000)		Almeno 1 volta nell'ultimo mese: 2,7 % (180 000) Almeno 10 giorni al mese: 0,9 % (60 000)	Almeno 1 volta nell'ultimo anno 15-24 anni: 20 % (190 000) Almeno 1 volta nell'ultimo mese 15-24 anni: 9 % (84 000)	Nessun decesso causato direttamente	Nessun dato specifico relativo alle singole sostanze. Secondo uno studio (2005), il consumo di sostanze illegali provoca costi di 4,1 mia. fr.	Entrate in trattamento in aumento (1061) Denunce per consumo: 34 421	Tendenzialmente stabile
Cocaina	Almeno 1 volta nell'ultimo anno: 0,5 % (35 000)		Almeno 1 volta nell'ultimo mese: 0,1 % (7000)	Almeno 1 volta nell'ultimo anno 20-34 anni: 1,5 % (23 000) Almeno 1 volta nell'ultimo mese 20-34 anni: 0,4 % (5700)	1 decesso		Entrate in trattamento in diminuzione (406) Denunce: 7721	Dati sanitari: tendenzialmente in diminuzione Dati di polizia: stabile a livello elevato
Eroina	1 volta nella vita: 0,5 % (35 000)		Cure sostitutive HeGeBe: 8 % di tutti i casi (1598) Metadone (2012): 17 500	1 volta nella vita 20-34 anni: 1,6 % (6700)	121 decessi (2012)		Entrate in trattamento: 1444 Denunce: 5398	In diminuzione
Ecstasy	Almeno 1 volta nell'ultimo anno: 0,2 % (14 000)		Nessun dato	Almeno 1 volta nell'ultimo anno 15-19 anni: 0,6 % (2600) 20-24 anni: 1,0 % (5000)	Nessun decesso causato direttamente		Entrate in trattamento Ecstasy + anfetamine 84 Denunce: ecstasy 842	In diminuzione
Anfetamine (speed)	Almeno 1 volta nell'ultimo anno: 0,3 % (24 000)		Nessun dato	Almeno 1 volta nell'ultimo anno 15-19 anni: 0,7 % (3000) 20-24 anni: 1,3 % (6500) 25-34 anni: 0,5 % (5600)	Nessun decesso causato direttamente		Entrate in trattamento Ecstasy + anfetamine 84 Denunce: anfetamine: 1280	In aumento
LSD	Almeno 1 volta nell'ultimo anno: 0,7 % (57 000)		Nessun dato	Almeno 1 volta nell'ultimo anno: 20-24 anni: 1,7 % (8500) 25-34 anni: 1,2 % (13 000)	Nessun decesso causato direttamente		Nessuno studio disponibile	Nessuna indicazione possibile

Medicamenti con effetti psicoattivi							
Psicostimolanti	Almeno 1 volta nell'ultimo anno: 0,7 % (50 000)	Nessun dato	Almeno 1 volta nell'ultimo anno 15-19 anni: 3,2 % (14 000) 20-24 anni: 2,2 % (10 800)	Nessun decesso causato direttamente	Nessuno studio disponibile	Nessuno studio disponibile	Nessuna indicazione possibile
Analgesici potenti	Almeno 1 volta nell'ultimo anno: 18 % (1 250 000)	Almeno 1 nell'ultimo mese: 8,5 % (600 000)	Base: ultimo mese Assunzione più volte alla settimana 45-54 anni: 52,4 % (29 000) 55-64 anni: 58,5 % 75+ anni: 77,7 %	Quota ignota di casi non rilevati	Nessuno studio disponibile	Nessuno studio disponibile	Nessuna indicazione possibile
Sonniferi e sedativi	Almeno 1 volta nell'ultimo anno: 10,2 % (800 000)	Almeno 1 nell'ultimo mese: 6,7 % (550 000)	Almeno 1 volta nell'ultimo mese 65-74 anni: 15,8 % (86 000)	Nessun dato	Nessuno studio disponibile	Nessuno studio disponibile	Nessuna indicazione possibile
Dipendenze non legate a sostanze							
Consumo di Internet	Consumo di Internet problematico: 0,9 % (60 000) Consumo di Internet sintomatico + problematico: 4,6 % (320 000)		Consumo di Internet sintomatico + problematico 15-19 anni: 24,8 % (109 000) Consumo di Internet solo problematico 15-19 anni: 6,5 % (28 700)	Sconosciuta	Nessuno studio disponibile	Nessuno studio disponibile	In aumento
Gioco d'azzardo (2012)¹	Almeno 1 volta nell'ultimo anno 46,4 % (3,2 mio.)	Gioco moderatamente a rischio: 2,9 % (200 000) Gioco problematico: 0,7 % (50 000) Gioco patologico: 0,4 % (27 000) Totale gioco d'azzardo eccessivo: 1,1 % (75 000)	20-64 anni: tendenzialmente più giocatori d'azzardo 15-20 anni e >65 anni: tendenzialmente meno giocatori Tendenzialmente più uomini e più persone con reddito mensile netto > 5000 franchi	Nessun decesso causato direttamente	Annuali: tra 551 mio. e 648 mio. fr.	Numero di esclusioni dal gioco attive nei casinò svizzeri 2008: 23 000 2012: 35 900	Rallentamento nel gioco d'azzardo legale
CONSUMO COMBINATO							
Almeno 2 sostanze	Consumo a rischio di almeno 2 delle seguenti sostanze: alcol, tabacco, canapa, medicinali 9 % della popolazione (600 000)						
Alcol +	Alcol e fumo: 15-29 anni Alcol non a rischio e fumo giornaliero: 14,3 % Alcol a rischio e fumo giornaliero: rischio raddoppiato di fumo giornaliero: 28,8 %	Alcol e canapa: 15-29 anni Alcol non a rischio e canapa almeno 1 volta/sett.: 2 % Alcol a rischio e canapa almeno 1 volta/sett.: rischio quadruplicato di consumo di canapa: 8 %		Sconosciuta	Nessuno studio disponibile	-	Tendenzialmente stabile
Fumo +	Fumo e alcol: 15-29 anni Non fumatori e alcol a rischio: 26,9 % (300 000) Fumo giornaliero e alcol a rischio: rischio raddoppiato di consumo di alcol: 52,5 %	Fumo e canapa: 15-29 anni Non fumatori e canapa almeno 1 volta/sett.: 2 % Fumo giornaliero e canapa almeno 1 volta/sett.: rischio quasi quadruplicato di consumo di canapa: 7,5 %		Sconosciuta	Nessuno studio disponibile	-	Tendenzialmente stabile
Canapa +	Canapa e alcol: 15-29 anni Niente canapa e alcol a rischio: 31,1 % (340 000) Canapa almeno 1 volta/sett. e alcol a rischio: rischio più che raddoppiato di consumo di alcol: 72,2 %	Canapa e tabacco: 15-29 anni Niente canapa e fumo giornaliero: 16,1 % Canapa almeno 1 volta/sett. e fumo giornaliero: rischio più che raddoppiato di fumo giornaliero: 36,6 %		Sconosciuta	Nessuno studio disponibile	-	Tendenzialmente stabile
Gioco problematico +	Circa tre quarti dei giocatori che richiedono una consulenza mostrano un altro comportamento di dipendenza: 60 % tabacco; 40 % alcol; 4 % droghe.						

¹Dati sulla prevalenza di consumo (se non diversamente specificato) provenienti da: Monitoraggio delle dipendenze 2013; Indagine sulla salute in Svizzera 2012.

²Dati sulle entrate in trattamento provenienti da act-info, Rapporto annuale 2012. I dati non includono tutte le entrate in trattamento, poiché non tutte le istituzioni forniscono dati alla statistica.

³Dati relativi alle tendenze basati su: rapporti annuali act-info 2005-2011 (alcol), Indagine sulla salute in Svizzera, www.suchtmonitoring.ch e informazioni dei Cantoni.